

---

**TRUCOS  
Y  
CONSEJOS  
PARA EL DIA DE SAN  
JUAN**

---





---

## Contacto

 C/Ballester 61- 63, 08023 Barcelona

 [veterinari@elputxet.com](mailto:veterinari@elputxet.com)

 932 53 09 90

 656 30 63 05

 651 87 91 80

# EL MIEDO A LOS PETARDOS

EL PUTXET VETERINARIS

---

## EL MIEDO A LA PIROTECNIA

El miedo a los ruidos fuertes, es un tipo de **fobia** que padecen muchos perros y gatos.

Puede aparecer

↙  
A lo largo de los años.

↘  
De manera espontánea por un hecho traumático.



---

## SIGNOS DE ALERTA

- ❖ **LEVES:** nerviosismo, jadeo, deambular, temblores, ladridos, rascado.
- ❖ **GRAVES:** vómitos, defecación, micción, destrozos, taquicardia y fuga.



---

## ADEMÁS EN GATOS

- ❖ Anorexia.
- ❖ Micción y defecación fuera de lugar.
- ❖ Esconderse.
- ❖ Fugarse.





---

## PROCEDIMIENTO EN CASA

- ❖ **Inicio:** 2 semanas antes de la fecha prevista (dependiendo de cada animal).
- ❖ **Importante tener un refugio:**
  - Alejado lo máximo del ruido.
  - Nunca encerrarlos.
  - Colchón y/o transportín en una zona segura con sus cosas.
  - Gatos: comedero y arenero juntos.
  - Acompañarlo durante el proceso.



---

## QUÉ NO HACER

- ❖ No actuar de **manera negativa:**
  - Gritar.
  - Golpear.
  - Castigar.
  - Encerrar.

AUMENTARÁN EL GRADO DE ANSIEDAD  
Y ESTRÉS EN EL QUE ESTÁN



---

## AYUDA EXTRA

- ❖ Cerrar ventanas y persianas.
- ❖ Ponerle música relajante.
- ❖ Ignorar los fuegos artificiales.
- ❖ Distraer a la mascota.
- ❖ No cambiar los hábitos.
- ❖ Acariciar pero no abrazar.



---

## COMO TRATARLO

Hay 2 tipos de tratamiento:

- ❖ **NATURAL:** se basa en el uso de feromonas y debe hacerse con antelación para mayor efectividad.
- ❖ **QUÍMICO:** necesitan receta veterinaria y tienen contraindicaciones y/o efectos secundarios.



---

## NATURALES

- ❖ Premios / comprimidos.
- ❖ Collares.
- ❖ Difusores.
- ❖ Sprays.
- ❖ Gotas.



---

## QUÍMICO

- ❖ **Comprimidos:** sedante hipnótico que provoca somnolencia y en caso de no ser efectivo se puede repetir la dosis en 1 hora.
- ❖ **Contraindicaciones:**
  - Enfermos cardíacos no controlados.
  - Efecto rebote.